

S -HSVAb (1615)**Sisältää osatutkimukset:**

S -HSV1AbG, KL 1862
S -HSV2AbG, KL 1864
S -HSV1AbM, 12052
S -HSV2AbM, 12053

Immunitteettitutkimusta varten IgG-luokan osatutkimukset voi pyytää erikseen.

Indikaatiot HSV1- ja HSV2- infektioiden diagnostiikka ja immunitteettitutkimus.

Näyte 1-2 ml seerumia.

Tutkimus voidaan tehdä myös likvorista (Li -HSVAb, KL 4407). Likvor-näytteen kanssa tulee lähettää aina myös samanaikaisesti otettu seeruminäyte.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunomenetelmä (EIA)

Toimitusaika 2-6 työpäivää

Viitearvot alle 9 VE

Tulkinta Tutkimus määrittää spesifisti HSV-1 ja HSV-2-vastaaineita. Merkittäviä ristireaktioita ei esiinny eri HSV-tyyppien välillä. Primaari-infektion ja reinfektioiden yhteydessä voidaan osoittaa IgM-luokan vasta-aineita. Iholla ja limakalvolla esiintyvässä primaari-infektiossa vasta-ainevaste saattaa olla hidas. Seurantanäyte suositellaan otettavaksi n. 3-4 viikon kuluessa. Herpesvirusviljely on ensisijainen diagnoosi rakkulaisessa herpesinfektiossa. Katso myös Herpes simplex virus, viljely. Tuloksesta annetaan lausunto.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi