

**fP-Pepsin1 (12741)**

Pepsinogeeni I erittyy pääasiassa mahalaukun limakalvon korpus-alueen pääsoluista. Se kuvaa näin ollen hyvin korpusalueen atrofiaa.

**Näyte** 1 ml (vähintään 0.5 ml) EDTA-plasmaa paastoverinäytteestä. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Esivalmistelu:**

Potilaan tulee olla juomatta, syömättä ja tupakoimatta 10 tuntia ennen näytteenottoa. Mahan eritykseen vaikuttavien lääkkeiden käyttö on lopetettava 24 tuntia ennen näytteenottoa (kts. GastoPanel).

**Säilytys ja lähetys** Plasma pakastetaan erottelun jälkeen ja lähetetään pakastettuna. Näyte voidaan lähettää kylmälähetyksenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)

**Toimitusaika** 7-12 työpäivää

**Viitearvot** 30-160 µg/l

**Tulkinta** Sisältyy Gastropanel-tutkimukseen.

**Tekopaikka** SYNLAB Tallinna

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi