

**B -Trom (2791)**

**Indikaatiot** Poikkeavan vuoto- tai tromboositaipumuksen diagnostiikka. Trombosytemian ja trombosytopenian osoittaminen ja seuranta veritautien tai lääkehoidon yhteydessä.

**Näyte** EDTA-veri.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä mahdollisimman pikaisesti

**Menetelmä** Katso Täydellinen verenkuva.

**Toimitusaika** 1 työpäivä

<b>Viitearvot</b>	Aikuiset		150-360 x E9/l
	Lapset,	0-6 vrk	140-290 x E9/l
		1-2 vk	150-340 x E9/l
		3-5 vk	180-450 x E9/l
		6 vk-1 v	200-450 x E9/l
		2-11 v	200-450 x E9/l
		12-16 v	200-450 x E9/l

**Tulkinta** Trombosyyttien lukumäärän laskiessa alle 100 x E9/l vuotoaika pitenee ja verenvuototaipumus lisääntyy. Hemorragisessa trombosytemiassa trombosyyttien lukumäärä on erittäin korkea, yli 1000 x E9/l.

**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius  
Puh.040 922 5301  
mikko.helenius@vita.fi