

-CandVi (1628)**Indikaatiot** Hiivainfektioepäily.

Näyte Näyte otetaan limakalvolta (suu, kieli, nielu, vagina) näytteenottoaluetta pumpulitikulla hangaten. Ulostenäytettä otetaan pumpulitikulla reilu tikunpään kokoinen määrä. Näytteenottotikku laitetaan bakteerikuljetusputkeen (esim. Transpocult® tai Copan®).

Säilytys ja lähetys Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti, mahdollisuuksien mukaan 2 vuorokauden kuluessa. Säilytys ennen kuljetusta jääkaapissa, kuljetus ympäristön lämpötilassa jäätymistä välttäen. Mikäli näytteiden toimittaminen laboratorioon kestää kauemmin, viljelytuloksen luotettavuus saattaa kärsiä.

Menetelmä Viljely.
HUOM! Mikäli limakalvosta (suu, kieli, nielu, vagina) eristetyille hiivakannalle halutaan tehtävän myös herkkyysmäärittäminen, on tutkimuspyyntö Hiiva, viljely ja herkkyysmäärittäminen (CandViHe, KL 12378)

Toimitusaika Työpäivinä. Tavanomainen vastausaika 2-6 työpäivää. Näytteen mahdolliset lisätutkimukset voivat pidentää tavanomaista vastausaikaa.

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Limakalvonäytteistä eristettyjen Candida-lajien merkitys vaihtelee kliinisen kuvan ja oireiden mukaan. Hiivakasvu vastataan lajinimellä.
Ulosteesta hiiva tutkitaan vain, jos kasvua on kohtalaisesti tai runsaasti. Pieni määrä hiivaa voi kuulua ulosteen normaaliflooraan, mutta kohtalainen tai runsas hiivalöydös voi mahdollisesti olla merkittävä löydös. Hiivat tunnistetaan lajitasolle.

Konsultointi Mikrobiologian laboratorio
Puh. 045 7734 9039

Mikrobiologi Taru Meri
puh. 044 0815731