

-HepyoNhO (6314)

Reagenssinvalmistajan toimitusvaikeuksien vuoksi ei tilattavissa 23.11.2023 alkaen !

Katso myös [Helicobacter pylori, antigeeni \(ulosteesta\)](#).

Indikaatiot *Helicobacter pylori* -bakteerin ja mahdollisen klaritromysiiniresistenssimutaation osoittaminen. Hätöhoidon onnistumisen arviointi aikaisintaan 4 viikkoa hoidon päättymisestä.

Näyte Uloste Copan eNAT-putkessa. Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi. Oikea näytemäärä putkessa on tärkeää menetelmän luotettavuuden kannalta: ohuelti ulostetta koko näytetikun pehmeän pään alueella.

Varoaika lääkkeille ennen näytteenottoa: protonipumpun estäjät 2 viikkoa, helikobakteerin häätöhoito ja muut antibiootit 4 viikkoa.

Säilytys ja lähetys Suositeltavaa on toimittaa näytteet mahdollisimman pian laboratorioon. Näytteiden säilytys 2 vrk jääkaapissa ja kuljetus ympäristölämpötilassa. Mikäli säilytysaika on pidempi, tulee näytteet pakastaa. HUOM! Tietyillä lääkeaineilla voi olla vaikutusta tulokseen, tarkista näytteen-otto -ohje!

Menetelmä Nukleinihapon osoitus PCR-menetelmällä. Klaritromysiiniresistenssiä osoittavien geenimutaatioiden tunnistaminen.

Toimitusaika 2-3 työpäivää

Viitearvot Normaalisti negatiivinen

Tulkinta Positiivinen löydös varmistaa *Helicobacter pylori* -infektion. Positiiviseen löydökseen vastataan tieto klaritromysiiniresistenssistä.

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
puh. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi