

S -BartAb (1819)

Sisältää osatutkimuksen S -BartAbM ja S -BartAbG

Indikaatiot *Bartonella henselae* -bakteerin aiheuttaman kissanraapimataudin (eng. cat scratch disease) ja *Bartonella quintanan* -bakteerin aiheuttaman juoksuhaudakuumeen (eng. trench fever) diagnostiikka. Veriviljelynegatiivisen endokardiitin etiologian selvitys.

Näyte 1 ml seerumia tai plasmaa.

Säilytys ja lähetys Säilytys enintään 7 vrk jääkaapissa, pidempi aika pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Epäsuora immunofluoresenssi (IFA) Akkreditoitu menetelmä.

Toimitusaika 4-5 työpäivää.

Viitearvot Negatiivinen, titteri 512
Epävarma löydös titteri 64-512; taustalla voi olla ristireaktio, jonka voi ai kaansaada esim. Q-kuumetta aiheuttava Coxiella burnetii tai hengitystieinfektioita aiheuttava Chlamydia pneumoniae.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi