

S -TrpaAb (4942)**Indikaatiot** Syfiliksen seulonta**Näyte** 2 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 7 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Elektrokemiluminometrinen**Toimitusaika** 1 työpäivä. Tuloksen mahdollinen varmistaminen vie n. 7 työpäivää.**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** S -TrpaAb -tutkimus on tarkoitettu syfiliksen seulontaan henkilöillä, jotka eivät ole aiemmin sairastaneet Treponema pallidum -infektiota. Se ei sovellu hoidon onnistumisen seurantaan eikä uusintainfektion diagnostikkaan. Jos S -TrpaAb on todettu jo aikaisemmin positiiviseksi, ei tutkimuksen toistaminen tuo lisäarvoa, koska sairastetun infektion jälkeen TrpaAb-positiivisuus säilyy yleensä vuosikymmenien ajan.

Uudet S-TrpaAb-positiiviset tapaukset varmennetaan ilman erillistä pyyntöä [S -TPHA](#) ja [S -KardAb](#) -tutkimuksilla ja lisäksi tarvittaessa immunoblot-tutkimuksilla. Varmistustestit laskutetaan erikseen.

Uusintainfektion epäilyssä suositellaan pyytämään tutkimukset S -TPHA ja S -KardAb.

Hoidon onnistumisen seurannassa riittää usein tutkimus S -KardAb yksin tai yhdessä tutkimuksen S -TPHA kanssa.

Kommentti Primaari-infektion alussa S -TrpaAb tulee positiiviseksi yleensä noin 2-4 viikkoa oireiden alkamisesta, mutta primäärisyfilis on poissuljettavissa vasta noin 8-10 viikon kuluttua.

Todistus pyydettyävä erikseen (S -TrpaAb Tod; nro 12111).
Todistuksen saa suomen-, englannin- ja/tai venäjän kielisenä.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi