

S -GadAb (4400)

Indikaatiot Diabetes tyyppi I:n varhaisdiagnostiikka ja riskin arviointi.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 1-2 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä Radioimmunologinen (RIA)

Toimitusaika 8 työpäivää

Viitearvot

alle 1.0 U/ml	negatiivinen
1.0 - 2.0 U/ml	harmaa alue
yli 2.0 U/ml	positiivinen

Tulkinta Kohonneet GAD-vasta-ainepitoisuudet ovat merkki autoimmuuniprosessista. GAD-vasta-aineet saattavat kohota jopa vuosia ennen taudin puhkeamista, mitä voidaan hyödyntää erityisesti aikuisiällä puhkeavan diabeteksen diagnostiikassa. GAD-vasta-aineita tavataan myös "stiff man"-oireyhtymää sairastavilla.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi