

KIHOMADOT (F-Enve-O)

Näyte otetaan heti aamulla ennen ulostamista ja peseytymistä, sillä kihomadot liikkuvat öisin peräaukon ympärillä. Formaliiniin otettu ulosteen parasiittinäyte ei sovellu kihomadon munien osoittamiseen.

- Hiero peräaukkoa ympäröivän ihon poimuja melko voimakkaasti veteen tai keittosuolaan (0,9% NaCl) kostutetulla pumpulitikulla.
- Työnnä tikku hetkeksi peräaukkoon n. 0.5 cm:n syvyyteen.
- Laita tikku nestettä sisältävään putkeen ja katkaise tarvittaessa niin, että saat putken suljettua.
- Kirjoita putken mukana tulleeseen tarralappuun nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä ja liimaa tarra näyteputken kylkeen.
- Laita näyteputki salpapussiin ja sulje pussi huolellisesti.
- Toimita näyte ja tämä lomake huolellisesti täytettynä näytteenottopäivänä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet.

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Näytteenottopäivämäärä: ____/____/____

Tiedustelut: