

Parasiitit (F -Para-O)

Parasiittien erittyminen ulosteeseen on ajoittaista, joten infektion poissulkemiseksi suositellaan otettavaksi useampia näytteitä parin päivän välein (3 näytettä 1-3 päivän välein).

- Ulostasta wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki).
- Ota ulostetta näytepurkin korkissa olevan lusikan avulla. Huomioi, että purkissa oleva formaliini on haitallista.
- Kiinteää ulostetta sekoitetaan noin teelusikallinen purkissa olevaan formaliiniin. Ripuliulostetta sekoitetaan noin ruokalusikallinen purkissa olevaan formaliiniin.
- Sulje purkki ja ravistele purkkia kunnolla. Ulosteen tulee olla hyvin sekoittunut formaliiniliuokseen.
- Kirjoita oheiseen tarralappuun nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä ja liimaa tarra näytepurkin kylkeen.
- Laita näytepurkki salpapussiin ja sulje pussi huolellisesti.
- Täytä huolellisesti kaikki tämän lomakkeen kohdat.
- Toimita näyte (näytteet) ja tämä lomake täytettynä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet.

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Näytteenottopäivämäärä: _____/_____/_____

Oletko ollut ulkomailla viimeisen 6 kk:n aikana? Kyllä En

Jos olet, niin missä ja milloin:

Jos olet, oliko matkan aikana tai sen jälkeen vatsaoireita?

Kyllä Ei

Kiinnitteenä käytetty formaliini on haitallista!

Formaliinin joutuessa iholle riisukaa saastunut vaatetus ja peskää iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella sekä rasvatkaa iho. Formaliinin joutuessa silmiin huuhdelkaa silmät runsaalla vedellä 10 - 15 minuutin ajan ja menkää välittömästi lääkäriin. Formaliinin joutuessa suuhun juokaa runsaasti nestettä ja menkää välittömästi lääkäriin. Älkää yrittäkö oksentaa.