

PARASIITIT (F - Para-O)

Parasiittien erittyminen ulosteeseen on ajoittaista, joten infektion poissulkemiseksi suositellaan otettavaksi useampia näytteitä parin päivän välein (3 näytettä 1-3 päivän välein).

- Ulostasta wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki).
 - Ota ulostetta näytepurkin korkissa olevan lusikan avulla. Huomioi, että purkissa oleva formaliini on haitallista.
 - Kiinteää ulostetta sekoitetaan noin teelusikallinen purkissa olevaan formaliiniin. Ripuliulostetta sekoitetaan noin ruokalusikallinen purkissa olevaan formaliiniin.
 - Sulje purkki ja ravistele purkkia kunnolla. Ulosteen tulee olla hyvin sekoittunut formaliiniliuokseen.
 - Kirjoita oheiseen tarralappuun nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä ja liimaa tarra näytepurkin kylkeen.
 - Laita näytepurkki salpapussiin ja sulje pussi huolellisesti
 - Täytä huolellisesti kaikki tämän lomakkeen kohdat.
- Toimita näyte (näytteet) ja tämä lomake täytettynä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet.

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Näytteenottopäivämäärä: ____/____/____

Oletko ollut ulkomailla viimeisen 6 kk:n aikana? Kyllä En

Jos olet, niin missä ja milloin: _____

Jos olet, oliko matkan aikana tai sen jälkeen vatsaoireita? Kyllä Ei

Kiinnitteenä käytetty formaliini on haitallista! *Formaliinin joutuessa iholle riisukaa saastunut vaatetus ja peskää iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella sekä rasvatkaa iho. Formaliinin joutuessa silmiin huuhdelkaa silmät runsaalla vedellä 10 - 15 minuutin ajan ja menkää välittömästi lääkäriin. Formaliinin joutuessa suuhun juokaa runsaasti nestettä ja menkää välittömästi lääkäriin. Älkää yrittäkö oksentaa.*