


CHLAMYDIA TRACHOMATIS JA NEISSERIA GONORRHOEAE (U -CtGcNhO)

Ennen näytteenottoa on oltava virtsaamatta ja suorittamatta alapesua vähintään yksi tunti.

Näytteenotto:

- Pese kädet ennen näytteenottoa. Ota näytteenottoastia valmiiksi koskematta astian sisäpintaan. Huom! Alapesua ei saa suorittaa.
- Virtsa normaalisti alkuvirtsaa näytteenottoastiaan 10 – 30 ml. Virtsan ensimmäiset pisarat on tärkeää saada astiaan. Huom! Luotettavan tuloksen saamiseksi virtsaa ei tule laskea näyteastiaan enempää. Loppuvirtsa lasketaan wc-altaaseen.
- Siirrä virtsanäyte annettuun näyteputkeen (cobas®PCR Media) välittömästi. Avaa putken korkki. Käsittele putkea korkin avaamisen jälkeen pystyasennossa, putkessa olevaa nestettä ei tule kaataa pois.



1. Ota virtsaa näytteenottoastiasta putkisetin pipettiin puristamalla pipetin yläosaa (a,b,c)
2. Siirrä virtsaa näyteputkessa olevan nesteen päälle puristamalla pipetin yläosaa. Oikea näytemäärä on kahden nuolen osoittamien mustien viivojen välissä.
3. Sulje näyteputken korkki tiiviisti kiertämällä.
4. Sekoita putkea ylösalaisin kääntelemällä 5 kertaa.

- Kirjoita oheiseen tarraan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Kiinnitä tarra näyteputkeen.
- Täytä tämän ohjeen ao. kohdat. Toimita näyteputki ja tämä ohje täytettynä saman päivän aikana laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet.

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Näytteenottopvm _____ / _____ / _____

Tiedustelut: