

Ulosteen Helikobakteeriantigeeni (F - HepyAg)

Tietyt lääkeaineet saattavat vaikuttaa testin tulokseen (katso oheinen taulukko). Antibioottihoidon ja helikobakteerin häätöhoidon loppumisesta tulee olla kulunut vähintään neljä viikkoa. Protonipumpun estäjien (PPI) käytöstä tulee olla olla kulunut vähintään 2 viikkoa.

- Ulosta wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki). Ripuliuloste ei sovellu näytteeksi.
- Ota noin ruokalusikallinen ulostetta oheiseen näytepurkkiin korkissa olevan lusikan avulla. Sulje purkki huolellisesti.
- Kirjoita oheiseen tarraan nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä ja liimaa tarra näytepurkin kylkeen.
- Laita näytepurkki salpapussiin ja sulje pussi huolellisesti.
- Täytä huolellisesti kaikki tämän lomakkeen kohdat.
- Toimita näyte ja tämä lomake täytettynä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet.

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Näytteenottopäivämäärä: _____ / _____ / _____

LÄÄKE	VAROAIKA
Helikobakteerin häätöhoito	Vähintään neljä viikkoa
Antibiootit	Vähintään neljä viikkoa
<u>Protonipumpun estäjät (PPI-lääkkeet):</u>	Vähintään kaksi viikkoa
Esomepratsoli	Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, Esomeprazole Orifarm, Esomeprazol Ratiopharm, eEsomeprazole Sandoz, Nexium,
Lansopratsoli	Vimovo
Omepratsoli	Gasterix, Helipak, Lansoprazol, Zolt
Pantopratsoli	Losec, Losec Mups, Omeprazol Actavis, Omeprazol Sanoswiss, Omeprazol Ratiopharm, Omestad
Rabepratsoli	Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pantoprazol Sandoz, Somac control, Somac, Pariet, Rabeprazol Krka
<u>Vismuttivalmisteet:</u>	Vähintään kaksi viikkoa
	Gastrodenol, Pylera

Tiedustelut: