

# Nielu- ja bakteeriviljelyiden C- ja G-ryhmän streptokokkien nimeämiskäytännöt

Arvoisa asiakas,

19.12.2022 alkaen nieluviiljelyissä (Ps-StrVi ja Ps-BaktVi) sekä märkänäytteiden bakteeriviljelyissä (Pu-BaktVi1 ja Pu-BaktVi2) käytetään alla kuvattuja nimeämiskäytäntöjä beetahemolyyttisten streptokokkien osalta.

Aiemmin käytössä on ollut C- ja G-ryhmien beetahemolyyttisille streptokokeille löydösnimet **Strep.betahemol. (C)** ja **Strep.betahemol. (G)**. Jatkossa näiden lisäksi käytetään yhteisnimitystä **Strep.dysgalact(C/G)**, silloin kun tarkempaa ryhmämäärittystä ei ole tehty. Löydökseen lisätään tarkentava lausunto ”C- tai G-ryhmän beetahemolyyttinen streptokokki”.

C-ryhmän ja G-ryhmän streptokokkien (*Streptococcus dysgalactiae*) aiheuttamat taudit ovat kliinisesti samankaltaisia ja ne voivat aiheuttaa A-streptokokin (*Streptococcus pyogenes*) tavoin muun muassa nielutulehdusta ja haavainfektioita.

## Lisätietoja

Vesa Kirjavainen  
Osastopäällikkö, sairaalamikrobiologi  
Kliininen mikrobiologia  
puh. 040 922 4822  
[vesa.kirjavainen@vita.fi](mailto:vesa.kirjavainen@vita.fi)

Sakari Jokiranta  
Ylilääkäri  
Kliininen mikrobiologia  
puh. 050 547 1184  
[sakari.jokiranta@vita.fi](mailto:sakari.jokiranta@vita.fi)