

## Parasiter i avföringen (F -Para-O)

Förekomsten av parasiter i avföringen kan vara periodisk, varav det rekommenderas att ta flera prover med några dagars mellanrum (3 prover med 1-3 dagars mellanrum

- Ta avföringsprovet i ett rent kärl (t.ex. en engångstallrik) eller wc-papper.
- Överför avföring till provtagningsburken med hjälp av skeden i burkens lock. Observera att provtagningsburken innehåller formalin, vilket är skadligt.
- Blanda ca. en tesked avföring i formalinet som finns i provtagningsburken. Vid diarré blandas ca. en matsked avföring i formalinet.
- Stäng provburken och skaka ordentligt. Avföringen bör vara väl blandad i formalinlösningen.
- Skriv ditt namn, din personbeteckning och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på provburkens sida.
- Sätt provburken i plastpåsen och tillslut den väl.
- Fyll i uppgifterna nedan.
- Lämna in provburken/-burkarna och den här blanketten ifylld till laboratoriet där du fick provtagningsmaterialet.

### Fyll i noggrant följande punkter:

Namn: \_\_\_\_\_

Personbeteckning: \_\_\_\_\_

Provtagningsdatum: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ KI \_\_\_\_\_

Har du varit utomlands under de senaste 6 månaderna?

Ja  Nej

När och var?

\_\_\_\_\_

Har du haft diarre/lösa avföringar under resan eller efteråt?  Ja  Nej

**Formalinlösningen i burken är hälsovådlig!** Om du får formalin på huden, klä av dig förorenade kläder, tvätta huden ordentligt med vatten och mild tvättlösning. Om du får formalin i ögonen, skölj med mycket vatten i minst 10-15 minuter och gå genast till läkare. Om du får formalin i munnen, drick mycket vatten och gå genast till läkare. Försök inte framkalla kräkningar