

Helicobakter i avföring (F -HepyAg)

Vissa läkemedel kan inverka på provresultatet (se bifogad tabell). Det bör ha gått minst fyra veckor sedan avslutad antibiotika- och helikobakteriemedicinering, och två veckor sedan bruk av protonpumpshämmare (PPI).

- Samla upp avföring i ett rent kärl (t.ex. en engångsbehållare). Överför ungefär en tesked av avföringen till den bifogade provburken med hjälp av skeden på burkens lock. Stäng provburken ordentligt.
- Skriv ditt namn, din personbeteckning och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på provburkens sida.
- Sätt provburken i plastpåsen och tillslut den väl.
- Fyll i uppgifterna nedan.
- Lämna in provburken och den här blanketten ifylld till laboratoriet där du fick provtagningsmaterialet.

Fyll noggrant i följande punkter:

Namn: _____

Personbeteckning: _____

Provtagningsdatum: ____/____/____

LÄKEMEDEL	LÄKEMEDELSUPPEHÅLL
Helicobacter utrotningsterapi	Minst fyra veckor
Antibiotika	Minst fyra veckor
protonpumpshämmare (PPI) Esomepratsol Lansopratsol Omepratsol Pantopratsol Rabepratsol	Minst två veckor Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, Esomeprazole Orifarm, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazole Sandoz, Nexium, Vimovo Gasterix, Helipak, Lansoprazol, Zolt Losec, Losec Mups, Omeprazol Actavis, Omeprazol Sanoswiss, Omeprazol Ratiopharm, Omestad Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pantoprazol Sandoz, Somac control, Somac, Pariet, Rabeprazol Krka
Vismut förberedelser	Minst två veckor Gastrodenol, Pylera

Förfrågningar: