

KORJATTU TIEDOTE: Terapeuttisen alueen päivitys tutkimuksille S - Fluoks (3805), S -Diatsep (1240), S - Oksat (2423), S -Venlaf (1958) ja S - Sertral (1937)

Arvoisa asiakas,

25.8.2026 julkaistua tiedotetta 36/2026 on korjattu, korjatut kohdat on merkitty harmaalla. Pahoittelemme virhettä.

Päivitämme seerumin fluoksetiinin, diatsepaamin, oksatsepaamin, venlafaksiinin ja sertraliinin terapeuttisia alueita vastaamaan uusimman 2026 AGNP:n* suosituksia.

Samalla muutamme oksatsepaamin lyhennettä kuntaliiton mukaiseksi S -Oxpam.

Muutokset astuvat voimaan **4.9.2026**.

Tutkimus	Uusi terapeutinen alue	Vanha terapeutinen alue
S -Fluoks	fluoksetiinin ja norfluoksetiinin yhteispitoisuus 500 - 1000 nmol/l	fluoksetiini 160 - 1400 nmol/l norfluoksetiini 170 - 1300 nmol/l
S -Diatsep	diatsepaamin ja nordiatsepaamin yhteispitoisuus 0,35 – 5,5 µmol/l	diatsepaamin ja nordiatsepaamin yhteispitoisuus 0,70 - 7,00 µmol/l
S -Oxpam (aiemmin S - Oksat)	0,7 - 4,2 µmol/l	0,35 - 3,50 µmol/l
S -Venlaf	venlafaksiinin ja desmetyylivenlafaksiinin yhteispitoisuus 500 - 2300 nmol/l	venlafaksiinin ja desmetyylivenlafaksiinin yhteispitoisuus 400 - 1500 nmol/l
S -Sertral	30 - 160 nmol/l	30 - 490 nmol/l

*Hart X, Gründer G, Hiemke C, et al: Consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in neuropsychopharmacology: update 2026- Pharmacokinetic, pharmacogenetic and clinical aspects. Pharmacopsychiatry 2026;59(04):166-295

Lisätietoja

Riia Plihtari
Kemisti, FT
045 773 490 26
riia.plihtari@vita.fi